

الشكل و التقديم: قرص للمص، علبه من 30 قرص.

القسم الصيدلاني: مضاد لمرض فقر الدم.

التركيب:

قرص واحد من نوفوفار يحتوي على 100 مغ من الحديد الاساسي.

(ت.ع.ع: هيدروكسيد الحديد متعدد المالتوز).

السواغات: لانتوز، كالسيوم الفوسفات ثنائي القاعدة، طلق، نشاء،

نشاء للعجين، ماء مطهر، ستيرات المغنيزيوم، بودرة نكهة

الشوكولاتة، اسبارتام

السواغات ذات التأثير الملحوظ: لانتوز، اسبارتام.

دواعي الاستعمال: يستعمل نوفوفار في علاج نقص الحديد الكامن

و المعلن. تشخيص و تحديد مدى نقص الحديد يجب ان تؤكد

بالتحاليل المخبرية.

الجرعات و طريقة الاستعمال:

عند الاطفال اكثر من 12 سنة و الكبار:

العلاج من نقص الحديد المعلن: قرص للمص 2 الى 3 مرات في اليوم،

خلال او بعد الوجبات.

العلاج و الوقاية من نقص الحديد الكامن: قرص للمص مرة واحدة

في اليوم، خلال او بعد الوجبات.

الجرعة و مدة العلاج حد درجة نقص الحديد: في حالة نقص الحديد

المعلن، يدوم العلاج من 3 الى 5 اشهر حتى تعديل تركيز

الهيموغلوبين.

في حالة نقص الحديد الكامن يدوم العلاج تقريبا شهر الى

شهرين.

يؤخذ عن طريق الفم.

مضادات الاستعمال:

-حساسية معروفة للمادة الفعالة و احد السواغات

-فرط الحديد (هيموكروماتوز، هيموسيدروز)

-اضطرابات في استعمال الحديد (انيميا بعد التسمم الرصاصي،

انيميا سيديراكريستيك، الثلاسيميا)

- جميع الانيميا الناجمة عن نقص الحديد (انيميا الدم

الانحلي)

-لا تاخذوا هذا الدواء في حالة بيلة الفينيل كيتون (مرض وراثي

يشخص عند الولادة)، بسبب وجود الاسبارتام.

التحذيرات و احتياطات الاستعمال:

تعالج الانيميا تحت المراقبة الطبية. في حالة عدم نجاعة العلاج

(بارتفاع تركيز الهيموغلوبين بحوالي 2 الى 3 غ/دل في الدم في 3 اسابيع)

يجب مراجعة العلاج.

يجب توخي الحذر عند الأشخاص المعرضين لحقن الدم باستمرار

لأن تزايدهم بالحديد موازاة مع الكريات الحمراء يمكن أن

يؤدي إلى فرط في الحديد.

اللاكتوز: هذا الدواء غير موصى به عند المرضى غير المتحملين

للغلاكتوز، عجز في اللاكتاز لاب و متلازمة سوء الامتصاص

الجلوكوز و الغلاكتوز (امراض وراثية نادرة).

التداخلات الدوائية:

لا توجد تداخلات مع مكونات الاطعمة او الادوية (تيتراسيكلين و مضادات الحموضة).

الحمل و الرضاعة:

الحمل: الدراسات المراقبة عند المرأة الحامل بعد الثلاثي الاول لم

تظهر اي اثار غير مرغوب فيها عند الأم و الجنين او المولود.

الرضاعة: حليب الام يحتوي طبيعيا على الحديد المتصل

باللاكتوترانسفيرين. لا نعلم كمية الحديد الناجمة من نوفوفار

التي تمر في حليب الام. ليس مؤكدا ان نوفوفار قد يسبب اثارا

غير مرغوب فيها عند الرضيع.

اذا كنت تودين الحمل خلال العلاج، يجب اعلام الطبيب.

اذا شخص الطبيب انيميا خلال الحمل، يجب اتباع تاشيراتة.

القدرة على سيطرة السيارات و العربات:

في هذا الخصوص لم تجرى اية دراسة. لكن قد لا يؤثر اخذ

نوفوفار على القدرة على سيطرة او استعمال العربات.

الاثار الغير المرغوب فيها :

الاثار الغير المرغوب فيها التالية ذكرت عند اخذ نوفوفار

متكررة: الغثسان، الإمساك، اسمرار الفضلات. تكون هذه الاثار

عادة خفيفة و عابرة.

احيانا: الصداع، آلام في البطن، اضطرابات المعدة، عسر الهضم،

القيء، إسهال، تلون رجلي اللسان.

نادرة: تلون شديد للبول.

نادرة جدا: امراض الحساسية، شرى، ربو، حكة، طفح، تفاعلات

جلدية المحلية.

يجب اخبار الطبيب او الصيدلي بكل عارض غير منتظر او مقلق.

فرط الجرعة: في حالة فرط في الجرعة، لا توجد تسمم او فرط في

الحديد مسجل الى الان.

بالفعل، الحديد في هيدروكسيد الحديد متعدد المالتوز لا يوجد في

الجهاز الهضمي في شكله الحر و لا يمتص بالانتشار.

الأعراض المعروفة لفرط الجرعة مع تحضيرات اخرى من الحديد

(املاح الحديد) مثل: هبوط في ضغط الدم، حالة صدمة،

الحماض الأيضي، والغيبوبة، والتشنجات / تقلصات لم تذكر مع

نوفوفار.

الحفظ: يحفظ في تعبئته الاصلية بدرجة حرارة اقل من 30 مئوية، في

مكان جاف بعيدا عن الضوء و الرطوبة.

لا يتك في تناول للاطفال.

الصانع و المعلن:

مخابر م.م.، العنوان: المنطقة الصناعية - بحرال- عنابة، الجزائر.

صاحب مقرر التسجيل:

ش.ذ.م.م نوفوميديس، العنوان: 103، حي روكازان، طريق رقم 115،

براقى - الجزائر العاصمة - الجزائر.

رقم مقرر التسجيل: 504 / 149 E 16/12

تاريخ اخر تحديث للنشرة: جويلية 2016.